

ANGINA PEKTORIS



- Javlja se tupa bol u području srca ili blizini prsiju ispod prsne kosti može se širiti u rame, ruku, vilicu, vrat, leđa ili druga područja
- Nastaje u slučaju povećane potrebe za kisikom – prilikom tjelesnog opterećenja ili uslijed stresa
- Može nastati i u stanju mirovanja

Simptomi i prepoznavanje



- Krvna žila koja je sužena zbog aterosklerotskog PLAKA ne može opskrbiti srčani mišić dovoljnom količinom kisika
- Srčani mišić, koji nije dovoljno opskrbljen kisikom, slabi

Može
uzrokovati

SRČANO ZATAJENJE

Simptomi i
prepoznavanje



- Rizični čimbenici za nastanak plaka su:

- Povišen kolesterol
- Aretrijski tlak iznad 140/90 mmHg
- Šećerna bolest
- Pušenje

Rizični čimbenici



- **Rizični čimbenici za nastanak plaka su:**

- Prekomjerna tjelesna težina
- Tjelesna neaktivnost
- Stres

Rizični čimbenici



- **Rizični čimbenici za nastanak plaka su:**

- Nasljeđene sklonosti
- Dob:
muškarci iznad 55 godina
žene iznad 65 godina

Rizični čimbenici



- Najbolja je prevencija utjecati na faktore rizika koji se mogu promijeniti:
 - prestanak pušenja,
 - smanjenje tjelesne težine (ako je ona povećana),
 - kontrola krvnog tlaka, šećera i kolesterola.
- Neka su ispitivanja pokazala da se utjecajem na faktore rizika može spriječiti napredovanje oštećenja koronarnih arterija.

Prevencija





**Izrada materijala sufinancirana je sredstvima Europske unije iz
Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski
potencijali 2014.-2020.**

*Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost
Koordinacije hrvatske obiteljske medicine*